DIARIO ¿Quieres Dejar de Fumar? Di por fin: iNo al cigarrillo gracias a Help! Help-eu.com OPINIÓN Firmas Viñetas **ENTREVISTAS Y** CHARLAS DIG. **ESPECIALES PUBLICIDAD** → aprendemas.com Cursos Másters **ESPAÑA** INTERNACIONAL **DEPORTES** Fútbol Baloncesto Motor Tenis Balonmano Ciclismo Golf Atletismo Más noticias **ECONOMÍA** Vivienda Automóviles **CULTURAY OCIO** Cine Televisión Música Libros SOCIEDAD Sucesos y tribu. Ciencia y salud Religión Educación Gente Gastronomía, vinos y lugares J. Ruiz de Infante

EL VIAJERO PLANETA SOSTENIBLE MAGAZINE

Microinjerto Capilar BCN

www.Instituto-Capilar.com

Clínica Capilar que garantiza su

cirugía capilar. Video Intervención

DISEÑO WEB TIENDA!

Implantes dentales IMOI Implantes y Dientes fijos en 1 hora Estetica facial y dental. Antiaging www.imoi.es

GRUPO SIGLO XXI





IVA y envío

Reproductor MP3 Radio FM / 4 GB / USB

Caben más de 800 MP3. Muy cómodo para hacer deporte

Jueves, 03 de septiembre de 2009 • Actualizado a las 11:02 (CET) • El tercer diario digital más leído según OJD • Fundado en noviembre de 2003

VÍDEOS ! | IMÁGENES | ÚLTIMA HORA | ENCUESTAS | EL TIEMPO | PÁGINAS BLANCAS | PÁGINAS AMARILLAS | CALLEJERO | CLASIFICADOS !



🔍 | Más

Medicina

Vela y Copa Am.

Prensa y medios

Ignacio de Cossío

PUBLICIDAD Santiago





El implante subcutáneo de gestágeno es el método anticonceptivo más eficaz que existe en la actualidad, según un estudio

GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)

El implante subcutáneo de gestágeno (un tipo de hormona sexual) es el método anticonceptivo más eficaz que existe en la actualidad, por delante de otros sistemas mucho más extendidos como el preservativo, la píldora o el dispositivo intrauterino (DIU), según sostiene una investigación realizada en la Universidad de Granada (UGR), que resalta que este método apenas produce fallos, precisa de pocas revisiones médicas y, en general, supone una menor pérdida de sangre para la mujer.

En concreto, este trabajo lo ha llevado a cabo Lorenzo Arribas Mir, médico del centro de salud de La Chana (Granada), y el mismo ha estado dirigido por Ramón Gálvez y Aurora Bueno, profesores del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UGR; y Juan Mozas Moreno, del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

De hecho, este trabajo revela que la tasa de fallos es de 0,05 embarazos por cada centenar de mujeres y año. Por contra, el preservativo masculino presenta una tasa de error de 15 embarazos por cada centenar de mujeres y año; la píldora clásica de ocho; el DIU de cobre de 0,8; la ligadura de trompas de 0,5; el DIU de levonorgestrel de 0,2, el dispositivo Essure un 0,2 y la vasectomía de 0,15.

Además, este implante apenas produce fallos, precisa de pocas revisiones médicas, es reversibles y las dosis de gestágeno son más bajas, sus niveles en sangre estables y, en la mayoría de las mujeres, supone una menor pérdida de sangre (el 39,5% de sus usuarias presenta un sangrado más escaso que antes de usarlo).

El estudio de Arribas Mir recoge la experiencia del centro de salud de La Chana en el uso de implantes subcutáneos de gestágeno en mujeres durante el período 2003 y 2005, lo que convierte este trabajo "en el estudio más amplio" realizado en España, tanto por la muestra poblacional como por el tiempo de seguimiento, según informó la UGR en una nota.

Para llevar a cabo su investigación, el autor realizó un seguimiento de la experiencia de los médicos de familia de este centro de salud en la inserción de 372 implantes subcutáneos de gestágeno en mujeres en el periodo de marzo de 2003 a diciembre de 2005, con su consiguiente seguimiento de tres años.

EN QUÉ CONSISTE EL IMPLANTE Y SEGUIMIENTO


En concreto, este implante se trata de una varilla flexible de color blanco, que se inserta bajo la piel en el brazo de la mujer. La edad media de la mujer en este estudio es de 27,2 años.

Una vez colocado el implante, el doctor Arribas realizó un seguimiento a la semana, a los tres meses y anualmente, hasta la caducidad del implante a los 3 años. Se estudiaron minuciosamente las retiradas antes de cumplir los 3 años y sus causas por razones de salud, aunque en el tercer año aún mantenían su implante subcutáneo 232 mujeres.

Con todo, la tasa de continuidad es alta, tanto en el primero como en el segundo año. Un 91 por ciento de las mujeres que participaron en el estudio mantenían el implante transcurrido un año, mientras que con otros métodos anticonceptivos (píldora clásica, anillo vaginal y parche) sólo un 68 por ciento de las mujeres lo mantienen después de este tiempo.

Las causas de retirada mas frecuentes de los implantes

Publicado el miércoles 2 de septiembre de 2009 a las 12:08 horas.



Otros textos de Medicina

- » Alumnos del Liceo Francés de Madrid no están preocupados y dicen que les han aconsejan no compartir botellas o bolis
- » Navarra inicia hoy el curso escolar de forma escalonada para evitar el contagio masivo de
- » La Junta de Andalucía publica las instrucciones generales para prevenir contagios en los centros
- » La empresa responsable de la pavimentación en Alcoy (Alicante) descarta presencia de legionela en el agua
- » SEMERGEN hace un llamamiento para que todos los profesionales sanitarios se vacunen contra la gripe A



Tratamiento dental

Implantes, dentadura postiza Nunca más miedo al dentista! www.miedo-al-dentista.es

Implantes

Aumenta el tamaño de tus mamas con cirugía. Especialistas médicos

www.cmcmedicalgroup.es

Implantes+dientes <u>en 1 h.</u>

Método NobelGuide, sin cirugía Clínica Vadenta (Madrid) www.implantes-clinicavadenta

¿Implante Dental?

Con la tarjeta Salud Prime tienes acceso a todas las ventajas. www.saludprime.es

Calcula Tu Peso <u>Ideal</u>

Descubre cuanto deberías Pesar y como Cuidarte! 0.3e/smswww.blinkogold.es/Test-Pesol

03/09/2009 11:02 1 de 2

subcutáneos fueron el sangrado excesivo (en un 12,4%) y el deseo de concebir (también en un 12,4%). Otros efectos secundarios, como el acné, la tensión mamaria, aumento de peso y otros, en conjunto supusieron un 5,9% de retiradas.

PRINCIPALES INCONVENIENTES

La investigación ha revelado también que los principales inconvenientes de estos implantes anticonceptivos son la dependencia del personal clínico para inserción y retirada; el alto coste económico inicial y el patrón de sangrado impredecible, aunque no supone riesgo para la salud.

En su trabajo, Arribas Mir destaca que la utilización de implantes subcutáneos por los médicos de familia es "factible, segura y bien aceptada por la población". Además, los implantes son un método anticonceptivo válido para cualquier edad y, generalmente, su inserción no presenta incidencias.

MEJORAR LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

El autor concluye que la sociedad ha disminuido su natalidad "como consecuencia del deseo de reducir el tamaño de la familia", por lo que opina que las autoridades sanitarias "deben realizar un mayor esfuerzo para mejorar la planificación familiar".

"El implante subcutáneo anticonceptivo de etonogestrel es un anticonceptivo reversible de larga duración que no requiere cumplimiento, característica que comparte con los DIUS. Una vez insertado, y hasta su retirada, protege a las mujeres del embarazo sin los riesgos de olvidos que si pueden existir con otros métodos", zanjó.

Escriba su opinión Nombre y apellidos * Comentario (máx. 1.000 caracteres) * E-mail (no se muestra) * Web Publicar (*) Obligatorio. NORMAS DE USO » El botón 'Publicar' se activa tras rellenar los campos obligatorios. » Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso. » Escriba con corrección ortográfica y gramatical. » El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

Información corporativa | Estadísticas | Publicidad | Contacte con nosotros

© SIGLO XXI | Director: Guillermo Peris Peris | Tel: (+34) 669 104458 | info@diariosigloxxi.com | Auditado por •/•

Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos. Toda responsabilidad derivada de los textos recae sobre sus autores. Reservados todos los derechos.

2 de 2 03/09/2009 11:02