

[Terapia con Células Madre](#) Tratamos Derrames Cerebrales Con Células Madre Del Propio Paciente [www.xcell-center.es/D](#)

[Crene: Daño cerebral](#) Rehabilitación Neurológica Tratamiento eficaz. [www.crene.es](#)

[Clinica San Vicente](#) Centro de rehabilitación cerebral A la vanguardia de la investigación [www.unidadasistencialesanvicente.ci](#)

Anuncios Google

ANÚNCIATE AQUÍ

500.000 lectores al mes

Solicita información :)



Opinión

Firmas

Viñetas

Entrevistas

Especiales

Cursos

Másters

España

Internacional

Deportes

Fútbol

Baloncesto

Motor

Tenis

Balonmano

Ciclismo

Golf

Vela y Copa Am.

Atletismo

Más deportes

ECONOMÍA

Vivienda

Automóviles

CULTURA Y OCIO

Cine

Televisión

Música

Libros

SOCIEDAD

Sucesos y tribu.

Ciencia y salud

Religión

Prensa y medios

Educación

Gente

Gastronomía, vinos y lugares

J. Ruiz de Infante

Toros

Ignacio de Cossío

## Medicina

# Una intervención neuropsicológica temprana reduce las secuelas de las personas con daño cerebral, según un estudio

GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han puesto de manifiesto que una rehabilitación neuropsicológica temprana permite reducir "considerablemente" las secuelas cognitivas, emocionales y de conducta que sufren las personas con daño cerebral adquirido, generalmente por traumatismos craneoencefálicos e ictus.

En concreto, este trabajo sostiene que dichos pacientes deben recibir tratamiento neuropsicológico ya en el hospital y no esperar a ser atendidos posteriormente por los servicios sociales, tras detallar que "una intervención temprana durante los seis primeros meses" minimiza las secuelas posteriores, según ha informado este martes la UGR.

Además, los autores del estudio recuerdan que los traumatismos craneoencefálicos y los ictus afectan a personas cada vez más jóvenes, a pesar de las campañas preventivas para reducir los accidentes de tráfico y mejorar los hábitos de salud cardiovascular.

Ambas patologías producen alteraciones sobre la conducta, fundamentalmente en las áreas cognitivas (atención y memoria), emocional (irritabilidad y falta de motivación) y del comportamiento (impulsividad y agresividad).

En la mayoría de los afectados quedan secuelas estables que impiden la recuperación de su nivel de funcionamiento previo, limitando gravemente la independencia en las actividades cotidianas, laborales, académicas y sociales. Por ello, el programa de intervención llevado a cabo en la UGR ha tenido como objetivo la reducción y compensación de las secuelas mencionadas.

Ahora, la investigación realizada por Alfonso Caracuel, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, y dirigida por los profesores Miguel Pérez y Antonio Verdejo, ha revelado que cuanto más se retrase el tratamiento, mayor repercusión tendrán las alteraciones emocionales y, por lo tanto, mayor influencia de éstas sobre las alteraciones emocionales y del comportamiento.

Para llevar a cabo este estudio, sus autores han trabajado con un grupo inicial de siete pacientes con daño cerebral adquirido y sus familiares, y se ha comparado con un grupo control de pacientes que no recibieron este tratamiento.

MEJORAS CONSTATADAS

Posteriormente, el programa se llevó a cabo con 18 pacientes y familiares. Los pacientes mejoraron en su funcionamiento cognitivo general (atención y memoria), en su estado emocional (menores niveles de depresión), en su actividad (reducción del estado de apatía) y en su capacidad para regular su comportamiento social.

Las personas que recibieron atención neuropsicológica temprana tuvieron a largo plazo una recuperación en los aspectos emocionales y cognitivos significativamente mayor que las que fueron atendidas cuando ya habían pasado más de seis meses.

"Con este trabajo se ha demostrado la importancia de trabajar conjuntamente los aspectos cognitivos, emocionales y comportamentales de las personas que se ven afectados tras el daño cerebral", ha reseñado Caracuel.

Parte de los resultados de este trabajo han sido publicados en

Publicado el martes 7 de septiembre de 2010 a las 12:52 horas.

» Enviar una carta al director

» Imprimir esta página

» Guardar y compartir

Menéame

GoogleWikio

Otros textos de Medicina

» Las sartenes con antiadherentes pueden aumentar los niveles de colesterol en niños, según estudio

» Los niveles de determinadas hormonas influyen en el "efecto rebote" de las dietas de adelgazamiento hipocalóricas

» Las personas con trastorno bipolar no son violentas, salvo cuando abusan de drogas o alcohol, según un estudio

» La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) organiza este viernes en Alcobendas un curso sobre Andrología

» Experto aboga por un cambio en la gestión del conocimiento y acortar la distancia entre investigación clínica y de base

[Centro de Desintoxicacion](#)  
Drogas. Tratamientos en Toda España 100% Éxito. Certificado M. Sanidad

[Tratamiento de Parkinson](#)  
Reducción de síntomas y reducción de fármacos [www.Parkinson-Therapie.com](#)

[Rehabilitación Cerebral](#)  
Somos pioneros en España ¡Siempre hay esperanza! [www.neurocrecer.es](#)

[Experto Universitario](#)  
Intervención Logopédica Universidad de Alcala [www.ich.es](#)

[Neuropsicología Clínica](#)  
Posgrado. Madrid, BCN y Valencia. También a distancia. Reconocido [www.isep.es](#)

revistas nacionales como "Rehabilitación" e internacionales como "Archives of Clinical Neuropsychology". También aparecerán próximamente en la revista "The Journal of Head Trauma Rehabilitation".

### Comentarios

### Escriba su opinión

Nombre y apellidos\*

Email (no se muestra)\*

Web

Comentario (máx. 1.000 caracteres)\*

Publicar

(\*) Obligatorio.

NORMAS DE USO

» El botón 'Publicar' se activa tras rellenar los campos obligatorios.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.