TELEPRENSA.ES
EL PERIÓDICO DIGITAL DE GRANADA

"Sexo es vida" Antonio Cobo, sacerdote

GRANADA

TITULARES: Góngora coincide con COAG y ASAJA en que el dinero del reciclaje

Una intervención neuropsicológica temprana reduce las secuelas de las personas con daño cerebral adquirido

- Científicos de la Universidad de Granada demuestran que los pacientes con traumatismos craneoencefálicos e ictus deben recibir tratamiento neuropsicológico ya en el hospital, y no esperar a ser atendidos posteriormente por los servicios sociales - Una intervención temprana, durante los 6 primeros meses, minimiza las lesiones posteriores, fundamentalmente en las áreas cognitivas (atención, memoria, planificación, etc), emocional (irritabilidad, falta de motivación, etc.) y comportamental (impulsividad, agresividad, etc.)

07-09-2010 17:11

GRANADA.- Investigadores de la Universidad de Granada han demostrado que la rehabilitación neuropsicológica permite reducir considerablemente las secuelas cognitivas, emocionales y de conducta que sufren las personas con daño cerebral adquirido, generalmente por traumatismos craneoencefálicos e ictus. Su trabajo ha puesto de manifiesto que estos pacientes deben recibir tratamiento neuropsicológico ya en el hospital, y no esperar a ser atendidos posteriormente por los servicios sociales, porque una intervención temprana (durante los 6 primeros meses) minimiza las secuelas posteriores.

Los traumatismos craneoencefálicos y los ictus son muy frecuentes y afectan a personas cada vez más jóvenes, a pesar de las campañas preventivas para reducir los accidentes de tráfico y mejorar los hábitos de salud cardiovascular. Ambas patologías producen alteraciones sobre la conducta, fundamentalmente en las áreas cognitivas (atención, memoria, planificación, etc.), emocional (irritabilidad, falta de motivación, etc.) y comportamental (impulsividad, agresividad, etc.). En la mayoría de los afectados quedan secuelas estables que impiden la recuperación de su nivel de funcionamiento previo, limitando gravemente la independencia en las actividades cotidianas, laborales, académicas y sociales.

El programa de intervención llevado a cabo en la Universidad de Granada ha tenido como objetivo la reducción y compensación de las secuelas mencionadas.

Una intervención temprana

Esta investigación ha sido realizada por Alfonso Caracuel Romero, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, y dirigida por los profesores Miguel Pérez García y Antonio Verdejo García. Su trabajo ha demostrado que cuanto más se retrase el tratamiento, mayor repercusión tendrán las alteraciones emocionales (primarias o derivadas directamente de la lesión y secundarias o consecuencia de los cambios en la vida de la persona) y por lo tanto, mayor influencia de éstas sobre las alteraciones emocionales y comportamentales.

Para llevar a cabo esta investigación, sus autores han trabajado con un grupo inicial de 7 pacientes con daño cerebral adquirido y sus familiares, y se ha comparado con un grupo control de pacientes que no recibieron este tratamiento. Posteriormente el programa se llevó a cabo con 18 pacientes y familiares. Los pacientes mejoraron en su funcionamiento cognitivo general (atención, memoria, etc.), en su estado emocional (menores niveles de depresión), niveles de actividad (reducción del estado de apatía) y en su capacidad para regular su comportamiento social. Sin embargo, dentro del grupo, las personas que recibieron atención neuropsicológica temprana tuvieron a largo plazo una recuperación en los aspectos emocionales y cognitivos significativamente mayor que las que fueron atendidas cuando ya habían pasado más de 6 meses.

COMPARTIR ESTA NOTICIA

- COMENTAR
- IMPRIMIR
- ENVIAR POR EMAIL

Veinticuatro familias tienen ya su vivienda protegida en Granada

La Guardia Civil detiene a cinco personas por el cultivo y tráfico de marihuana

Los alumnos de Ciencia Política de la UGR simulan la gestión de crisis internacionales valiéndose de un proyecto de innovación docente

Detienen a un hombre que presuntamente asaltó una vivienda, propinó una paliza al propietario y luego robó un coche

MAS LEÍDOS

- RETA dejará de trabajar con más de 80.000 empresas andaluzas
- El Granada CF cae injustamente ante el "gallito" Valladolid, 0-1
- Conciertos, baile, teatro y deporte llenan la Feria de Baza 2010
- Continúa la huelga convocada por el Comité de Empresa de Transportes Rober
- Los populares califican la visita de Griñán a Loja "de foto y pandereta"
- El Patronato de Deportes de Granada oferta este año 60.401 plazas para la práctica de actividades físico-deportivas

Su inmobiliaria de confianza

español que demostrasen la eficacia de los programas holísticos de rehabilitación neuropsicológica. “Con este trabajo –apunta el investigador- se ha demostrado la importancia de trabajar conjuntamente los aspectos cognitivos, emocionales y comportamentales de las personas que se ven afectados tras el daño cerebral”.

Parte de los resultados de este trabajo han sido publicados en revistas nacionales (Rehabilitación) e internacionales como Archives of Clinical Neuropsychology, y aparecerán próximamente en la revista The Journal of Head Trauma Rehabilitation.

Envianos un comentario

* Campos obligatorios.

* Nombre:

* Email:

* Comentario:

* Captcha:

Introduzca el contenido de la imagen.

Enviar comentario

Comentarios:

No hay comentarios

Hemeroteca de **sociedad**

Día	Mes	Año	
Null	Null	Null	Ver hemeroteca

Anteriores | Siguientes

Colocación de una valla en contra de la violencia hacia las mujeres en La Zubia

Más de 1.000 participantes han pasado por las 84 Escuelas de Padres y Madres de Granada este año

Continúa abierta la inscripción en las actividades culturales de Extensión Universitaria, convalidables por 3 créditos de libre configuración

Los coleccionables pueden provocar que personas con tendencia a sufrir un trastorno obsesivo compulsivo desarrollen antes esta patología

Detenido un segundo joven por su participación en catorce robos consumados mediante 'tirón' en Granada

IR AL PRINCIPIO

DOCUMENTOS DE INTERÉS