

Ingresar | Registrarse



T: 23°ST: 24H: 74% >>

Miércoles 16 de febrero de 2011 09.18 Hs.

ULTIMO
MOMENTO

NOTICIAS

DEPORTES

OCIO

OPINION

COMUNIDAD

EDUCACION

SALUD

VIDEOS

Clasificados

Salud y calidad de vida

08:11 | martes, 15 de febrero de 2011

Salud

La falta de zinc y cobre en embarazadas aumenta el riesgo de abortos

Este déficit es corregible con medidas dietéticas y farmacológicas con las que se podría disminuir el 15 por ciento de mujeres que tienen un aborto espontáneo sobre todo durante el primer trimestre de embarazo



La investigación también indagó en el consumo de cafeína durante el embarazo

Galería de Imágenes

Científicos de una universidad española han confirmado que un bajo nivel plasmático de cobre y zinc en mujeres embarazadas puede ser un factor asociado al aborto espontáneo, una hipótesis que hasta ahora no se había comprobado en humanos.

Este déficit es corregible con medidas dietéticas y farmacológicas con las que se podría disminuir el 15 por ciento de mujeres que tienen un aborto espontáneo sobre todo durante el primer trimestre de embarazo, informó la Universidad de Granada (UGR), a la que pertenecen los científicos.

En el estudio han participado 265 embarazadas, de las cuales 132 habían padecido un aborto espontáneo en el último año y las 133 restantes con embarazo evolutivo.

A todas ellas se les practicó una ecografía, se les extrajo una muestra sanguínea para análisis y se les hizo un cuestionario.

Así se pudo determinar la existencia de diferencias en las concentraciones plasmáticas maternas de cobre y zinc y que esta deficiencia de uno o ambos oligoelementos estaba relacionada con la aparición de aborto espontáneo.

La investigación también ha obtenido datos acerca de otros temas como la suplementación preconcepcional y prenatal con yodo y folatos -sustancias que se han demostrado eficaces contra los abortos y las malformaciones del feto-, la disfunción tiroidea o el consumo de fármacos en las primeras semanas del embarazo.

El 81 por ciento de las 132 participantes que no llegaron al final del embarazo habían consumido algún fármaco y el 13,6 por ciento estuvieron expuestas a medicamentos desaconsejados por los especialistas.

Además, un tercio de las mujeres que abortaron se habían declarado fumadoras habituales y el 16,6 por ciento consumían café por encima de las dosis recomendadas.

Fuente: EFE

Herramientas

imprimir

enviar por e-mail

A A A

RSS

Compartir

Anuncios Google

Terapia con Células Madre

Nuevos tratamientos para mejorar la situación de enfermos degenerativos

www.xcell-center.es/CelulasM

Dexeus. Salud de la mujer

Ginecología.
Embarazo y Parto.
Reproducción Asistida.

www.dexeus.com

Parar de fumar sano

Descubra como se deja de fumar de manera sana con su doctor

DejadeFumarconAyuda.es

Incontinencia Urinaria:

Información útil y actualizada para pacientes, profesionales sanitarios

Densia de Danone

¿Son tus huesos tan fuertes cómo crees?
¡Haz el test y compruébalo!

www.densia.com

Complejos Minerales

Complejos Multiminerales, Minerales Aislados como complemento. HSNstore

www.HsnStore.com

Sanitas Más 90

Disfruta de las Ventajas de Sanitas 3 Meses Gratis. Llama 900 866 178

www.sanitasseguros.com



Anuncios Google



aviso legal

Portal Desarrollado por Ellektra Imagen Global

Copyright 2006 Rosario3 © Todos los derechos reservados