HERALDO DE SORIA
Miércoles, 28 de Septiembre de 2011

Sociedad

¿Y tú qué opinas?

FOROS
Heraldodesoria.es.

ESTUDIO CIENTÍFICO

Las mujeres obesas tienen más probabilidad de sufrir cán mama

La investigación realizada por la Universidad de Granda revela además que la posibilidad de padecer cáncer c mucho más elevada cuando se trata de pacientes con obesidad mórbida.

EFE. GRANADA

Las **mujeres obesas** son más propensas a sufrir **cáncer de mama** que el resto y desarrollan esta enf prematura, según un estudio de la **Universidad de Granada.**

La investigación revela además que la posibilidad de padecer cáncer de mama es mucho más elevada c pacientes con obesidad mórbida, ha informado la universidad en un comunicado.

Las conclusiones de este estudio, liderado por la catedrática del departamento de Enfermería María Jos han sido publicadas recientemente en la revista **Nutrición Hospitalaria.**

Para llevar a término el estudio, los investigadores manejaron una muestra formada por 524 pacientes femenino, diagnosticadas y tratadas de cáncer de mama en el **Hospital universitario San Cecilio de** enero de 2009 y septiembre de 2010.

Analizaron la relación existente entre el estado nutricional de las mujeres (normopeso, obesidad y obe la edad a la que fueron diagnosticadas de cáncer de mama, distinguiendo entre mujeres con anteceden este tumor y las que no.

El **análisis** demostró que la obesidad en las mujeres se asocia con una edad más temprana de diagnós mamario.

Según los investigadores, estos resultados contrastan con los obtenidos en otros estudios anteriores, q las personas con un índice de masa corporal elevado tenían un menor riesgo de padecer **cáncer de ma**

A tenor de los resultados, los científicos afirman que las mujeres diagnosticadas de cáncer a edades má aquellas que en su día tuvieron su primera regla de manera muy precoz, entre los nueve y los diez añ

Así, la edad de la primera menstruación constituye un factor determinante en la edad de aparición y di cáncer mamario, más aún en aquellas mujeres afectadas por obesidad mórbida.

Pese a la importancia de los antecedentes familiares con cáncer (hasta un 18 % de las mujeres obesas mama los tenían), el estudio determinó que es la obesidad, y dentro de ésta los estados más severos o factor más implicado en el desarrollo prematuro de este tipo de tumores.