

Biomedicina y Salud: Medicina preventiva

Las mujeres obesas tienen más probabilidad de sufrir cáncer de mama

Científicos de la [Universidad de Granada](#) (UGR) han demostrado que las mujeres con sobrepeso, sobre todo las que padecen obesidad mórbida, desarrollan esta enfermedad de forma prematura. En el estudio participaron 524 mujeres con cáncer de mama. Su trabajo demostró que las mujeres diagnosticadas de cáncer a edades más tempranas son aquellas que tuvieron su primera menstruación de manera muy precoz, entre los 9 y los 10 años.

FOTOGRAFÍAS

UGR | 27.09.2011 13:44



Científicos de la [Universidad de Granada](#) (UGR) han demostrado que las mujeres con sobrepeso, sobre todo las que padecen obesidad mórbida, desarrollan esta enfermedad de forma prematura. Imagen: Colin Rose

Las mujeres obesas tienen una probabilidad mucho más alta de sufrir cáncer de mama que las demás, y desarrollan esta enfermedad de forma prematura. Además, la posibilidad de padecer cáncer de mama es mucho más elevada cuando se trata de pacientes con obesidad mórbida.

Esta es una de las principales conclusiones de un artículo publicado recientemente en la revista *Nutrición Hospitalaria* por científicos del grupo de investigación CTS 367 de la [Universidad de Granada](#), liderados por la catedrática del departamento de Enfermería María José Aguilar Cordero.

Para llevar a término este trabajo, los investigadores manejaron una muestra formada por 524 pacientes del sexo femenino, diagnosticadas y tratadas de cáncer de mama en el Hospital universitario "San Cecilio" de Granada, entre enero de 2009 y septiembre de 2010. Analizaron la relación existente entre el estado nutricional de las mujeres (normopeso, obesidad y obesidad mórbida) y la edad a la que fueron diagnosticadas de cáncer de mama, haciendo distinción entre mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama y las que no.

Su análisis demostró que la obesidad en las mujeres se asocia con una edad más temprana de diagnóstico de cáncer mamario, unos resultados que contrastan con los obtenidos en otros estudios anteriores, que señalaban que las personas con un índice de masa corporal elevado tenían un menor riesgo de

padecer cáncer de mama.

Edad de la primera menstruación

Los científicos de [la UGR](#) afirman que, a la luz de sus resultados, las mujeres diagnosticadas de cáncer a edades más tempranas son aquellas que en su día tuvieron su primera regla (menarquia) de manera muy precoz, es decir, entre los 9 y los 10 años de edad. De este modo, la edad de la menarquia constituye un factor determinante en la edad de aparición y diagnóstico del cáncer mamario, más aún en aquellas mujeres afectadas por obesidad mórbida.

Por lo tanto, a pesar de la indudable importancia de los antecedentes familiares con cáncer (hasta un 18% de las mujeres obesas con cáncer de mama los tenían), y con ello del componente genético de esta neoplasia, en el estudio realizado en [la UGR](#) resultó ser la obesidad y, dentro de ésta, los estados más severos o mórbidos, el factor más implicado en el desarrollo prematuro de este tipo de tumores.

Localización: Andalucía



Me gusta

0

Comentarios (0)

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las mujeres obesas tienen más probabilidad de sufrir

Científicos de la [Universidad de Granada](#) (UGR) han demostrado que las mujeres con sobrepeso, sobre todo las que padecen obesidad mórbida, desarrollan esta enfermedad de forma prematura. En el estudio participaron 524 mujeres con cáncer de mama. Su trabajo demostró que las mujeres diagnosticadas de cáncer a edades más tempranas son aquellas que tuvieron su primera menstruación de manera muy precoz, entre los 9 y los 10 años.

Diseñan un sistema de realidad virtual para difundir el

Un equipo multidisciplinar de Jaén (UJA) ha diseñado un sistema informático que suministra información sobre la forma de audio e imagen se realiza. El sistema se está basado en la...

Las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama alargar la lactancia

Una nueva investigación realizada en España durante el siglo XX. Los expertos en evolución con factores como la incorporación laboral, las recomendaciones sanitarias, la ampliación...

Descubren una nueva forma de congenita

Un estudio internacional de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid ha descubierto una nueva forma de inmunodeficiencia congénita cuyo diagnóstico prenatal de mejorará el tratamiento inmunodeficiencias con nueva inmunodeficiencia...

El déficit de vitamina B12 puede ser un factor de riesgo para sufrir

Tener niveles bajos de vitamina B12 en la sangre puede ser un factor de riesgo para sufrir atrofia del cerebro. Un nuevo estudio, realizado en EE. UU., que muestra que presentaban estas deficiencias puntuaciones más bajas de habilidad...