



## Medicina

# La exposición de las embarazadas a contaminantes ambientales determina peso y talla de los niños al nacer

### Agencias

@DiarioSIGLOXXI

Martes, 18 de octubre de 2011, 18:09

Me gusta

0

0

Comentar

GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)

Científicos de la Universidad de Granada (UGR) han descubierto que las mujeres embarazadas que residen en grandes ciudades tienen más posibilidades de tener un niño de mayor talla y peso que las que viven en el medio rural, probablemente debido a una mayor exposición a los xenoestrógenos, un tipo de contaminantes ambientales que se comportan como hormonas. Se trata de la primera investigación realizada en España que asocia la carga estrogénica de la placenta de las embarazadas con un mayor peso del niño al nacer.

Para llevar a cabo este trabajo, los investigadores analizaron las características de dos poblaciones de mujeres embarazadas y de sus hijos al nacer, residentes en Granada y Madrid, y comprobaron que ambas poblaciones de mujeres presentaban características biológicas, demográficas y socio-económicas específicas que definen los patrones de exposición ambiental debida a los xenoestrógenos presentes en la placenta, ha informado la UGR en un comunicado.

Las madres incluidas en el estudio de Madrid estaba formado por un grupo de mujeres residentes en área urbana, con un nivel educativo medio-alto, trabajando la mayoría (89 por ciento) fuera de casa, en ocupaciones relacionadas con tareas administrativas, o con la enseñanza.

Por el contrario, las madres incluidas en el estudio de Granada residían mayoritariamente en áreas rurales, poseían un nivel educativo bajo, (un 53,4 por ciento no tenía estudios o sólo contaba con estudios primarios) y un alto porcentaje de las mismas se dedicaban exclusivamente a las tareas domésticas (38,3 por ciento).

### FACTORES QUE CONDICIONAN LA EXPOSICIÓN

Se estudiaron los factores que condicionan la exposición y se analizó la asociación entre las características antropométricas y sociodemográficas, las condiciones de salud, el estilo de vida, las condiciones de trabajo, con el parámetro de exposición definido como carga estrogénica total efectiva.


De este modo, los científicos de la UGR comprobaron que el efecto estrogénico del extracto tisular placentario (TEXB) tiene una relación directa con ciertas características de los padres, del parto y de los recién nacidos. Así, la mayor TEXB de la fracción alfa se observó en placentas de mujeres de más edad, con menor índice de masa corporal, residentes en Madrid y que dan a luz niños con mayor peso al nacer. Estos resultados sugieren un papel a la estrogenicidad del conjunto de xenoestrógenos acumulados en el tejido placentario, en el desarrollo embrionario-fetal.

Este trabajo ha sido realizado por María Remedios Prada Marcos, del departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, y dirigido por los profesores Nicolás Olea Serrano; Mariana Fátima Fernández Cabrera y Julio J. Boza Puerta.

Remedios Prada refiere que, por lo general, la mayoría de los trabajos sobre exposición a contaminantes ambientales se centran en la cuantificación de compuestos químicos de forma aislada.

PUBLICIDAD ►

PUBLICIDAD ►



### Noticias relacionadas

» Uno de cada cinco pacientes trasplantados renales desarrolla hipertensión arterial resistente

» Ocho de cada diez mujeres con cáncer de mama están satisfechas con el apoyo emocional recibido

» La osteoporosis provoca tres fracturas vertebrales cada minuto

» Barkos defiende la sanidad pública y resalta que el cáncer de mama "aquí se cura"

» Más de 14.000 mujeres se han sometido a mamografías entre enero y septiembre para detectar un cáncer precoz

PUBLICIDAD ►

www.ceac.es

### EAE - Deusto

Masters empresariales EAE - Deusto con certificado universitario [www.eae-deusto.es](http://www.eae-deusto.es)

### Cursos Gratis del Inem

+260 Cursos Gratis (Subvencionados) Apúntate a hacer Cursos Sin Pagar [CursosGratis.eMagiste](http://CursosGratis.eMagiste)

### Posgrado online UOC

Administración electrónica Últimas plazas. Regístrate YA [www.uoc.edu/Posgrad](http://www.uoc.edu/Posgrad)

### Cursos FP a distancia

Formación Profesional a distancia. ¡Mejora ya tu futuro profesional! [www.ceac.es](http://www.ceac.es)

"Sin embargo, en la actualidad el censo de sustancias químicas de síntesis disponibles supera las 100.000, lo que posibilita y favorece la acción combinada de varios de ellos, con un resultado final impredecible, que pudiera ser aditivo, sinérgico e incluso antagónico. De este modo concentraciones consideradas en el modelo toxicológico clásico como insignificantes podrían tener en forma combinada un efecto acumulativo significativo. Por eso en este trabajo hemos abordado la exposición utilizando un biomarcador de efecto combinado", señala.

En la actualidad, las autoridades sanitarias de diferentes países están tratando de implantar sistemas de vigilancia de exposición humana a contaminantes ambientales, mediante la utilización de biomarcadores de exposición, como por ejemplo se hace en Estados Unidos con la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, o de forma particular en España en el Proyecto Infancia y Medioambiente (INMA).

PUBLICIDAD &gt;

PUBLICIDAD &gt;



**vodafone**  
**Tarjeta SIM suelta**  
**Elige tu Tarifa >**  
**power to you**

## Comentarios

### Escriba su opinión

Nombre y apellidos\*

Email (no se mostrará)\*

Su blog o sitio web

Comentario (máx. 1.000 caracteres)\*



(\*) Obligatorio

#### NORMAS DE USO

- » El botón 'Publicar' se activa tras rellenar los campos obligatorios.
- » Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.
- » Escriba con corrección ortográfica y gramatical.
- » El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.
- » El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

PUBLICIDAD &gt;

PUBLICIDAD &gt;

**¡Eres nuestro visitante 1.000.000  
NO ES BROMA!**

Online ahora

Nuestro generador aleatorio te acaba de elegir  
como el posible **GANADOR EXCLUSIVO de un  
VALE de 1.000€ para:**

**El Corte Inglés - IKEA - Mango - fnac**

[>>Haz click aqui<<](#)