

- [Portada](#)
- [Actualidad](#)
- [Noticias científicas](#)
- [Entrevistas](#)
- [Opinión](#)
- [Vídeos](#)
- [Archivo "Salut i Força"](#)
- [Archivo "Salut i Ciencia"](#)
- [Sobre Salut i Força](#)
- [Contacto](#)



En portada

- Las personas nacidas en la...
- [Sólo una de cada tres mujeres...](#)
- [Proponen aglutinar a los...](#)
- [Científicos advierten de que en...](#)
- [Recomiendan una revisión...](#)
- [Los ensayos clínicos para...](#)
- [El Hospital Son Espases llega al...](#)
- [Preocupados por los derechos](#)
- [Grau i Màster en Medicina](#)
- ["Los donantes son..."](#)
- [Expertos nutricionistas...](#)
- [El PP del Senado asegura que...](#)
- [El humo del tabaco agrava los...](#)
- [Tener la voz sana y cuidada...](#)
- [Más de 4.000 personas en...](#)
- [El 86% de los españoles piensa...](#)
- [Los nuevos tratamientos han...](#)

Comentarios recientes

- HOLA MI MADRE TIENE ESA ENFERMEDAD Y ES MUY DOLOROSA E INCLUSO YA LE ENPESARON A...**
(JUDIT RAMOS ORANTES)
- que tal hace 2 meses en mi segunda cesarea tuve una hemorragia y me tuvieron que... (CHIQUIS)
- hola. les cuento yo me realice una histerectomia en el mes de febrero ,aparte me... (lidia)
- Hola, tengo 48 años y hace 10 me retiraron la matriz, me dejaron los dos... (Susy)
- quisiera hacerme el implante d siliconas pero el tiempo q quiere estar en reposo no... (cielo araki)
- Soi muje tengo un nobio ime in teresa sabel siel papi loma se tra mite con... (gabriela sierra)

Las personas nacidas en la posguerra y en invierno tienen más posibilidad de sufrir esquizofrenia



E.P.

Las personas nacidas durante la posguerra --hasta 1959-- y durante los meses de invierno tienen más posibilidades de desarrollar esquizofrenia en el comienzo de la edad adulta. Y es que el riesgo de padecer esta enfermedad mental está relacionado con el déficit de vitamina D, que en parte podría explicar la asociación observada entre nacer en invierno y el mayor riesgo de esquizofrenia y también la mayor prevalencia de esta patología detectada en países más al norte, donde hay menos luz solar.

- [Añadir comentario](#)
- [Enviar a un amigo](#)
- [Enviar a Menéame](#)

Estos son algunos de los resultados de un artículo publicado en la prestigiosa revista 'Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry' por científicos de la Universidad de Granada sobre datos de personas que requirieron hospitalización psiquiátrica entre 1998 y 2006.

El estudio confirma que entre quienes padecen esquizofrenia hay una elevada proporción de nacidos en invierno, especialmente en el mes de enero (comparada con la proporción en los otros meses del año). En el estudio ha colaborado el Doctor Francisco Díaz Atienza, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, junto a investigadores del Departamento de Psiquiatría y del Instituto de Neurociencias (José María Martínez-Ortega, María Dolores Carretero, Luis Gutiérrez-Rojas, Dolores Jurado y Manuel Gurpegui).

El objetivo de esta investigación fue comparar las tasas de nacimiento en invierno entre 321 pacientes con esquizofrenia de Granada hospitalizados entre los años 1998 y 2006. Además, se analizó si la proporción de pacientes con esquizofrenia nacidos en invierno se distribuía por igual entre hombres y mujeres; y también si esta proporción fue distinta entre los nacidos durante la posguerra de la guerra civil española (un tiempo caracterizado por una mayor restricción alimentaria) y los nacidos después.

El estudio mostró que la diferencia del exceso de nacimientos en invierno entre hombres y mujeres con esquizofrenia fue similar. Estudios previos demuestran que los varones con esquizofrenia nacidos en invierno tienen un comienzo más temprano de la enfermedad, presentan menos antecedentes familiares y nacen con más frecuencia en zonas urbanas. Además, los hombres podrían ser más vulnerables que las mujeres al efecto de complicaciones obstétricas en el segundo trimestre de embarazo, debido a la menor maduración en útero y al mayor número de alteraciones estructurales cerebrales.

Al comparar los nacidos durante la posguerra (hasta el año 1959) con los nacidos después, los investigadores observaron que la proporción de nacimientos en invierno en pacientes con esquizofrenia durante el periodo de posguerra fue del 40 por ciento, significativamente superior al 28 por ciento observado de 1960 a 1986.

23 Abril, 2012 13:30 Noticias científicas Anterior Comentarios (0)

Comentarios

Añadir comentario

Los comentarios son moderados para evitar spam. Esto puede hacer que tu escrito tarde un poco en ser visible.

Título

Texto

Tu nombre

Email

yo empeze kon un dolor de cintura como de parto depues sigio mis piernas y mis... (liz sarabia)

hay algun ejercicio que ayudude a mejorar el musculo pelvico y levantar nuevamente... (Olga Lucia)

Web

Enviar

Editorial Fangueret, SL

Carrer de la Barcarola, 2-2ªA- 07010 Palma de Mallorca

[Formulario de contacto](#) - Tfno: 971 72 44 46

Subscripción vía [RSS](#)

W3C Valid [XHTML](#), [CSS](#)

[Créditos](#)