

España

noticias, artículos ...

Buscar

Portada	España	Mundo	Política	Dinero	Deportes	El Tiempo	Salud	Sucesos	Tierra	Ciencia	Educa	Empleo	Motor	Tecno	Ocio
Gente	Tele	Música	Cine	Cultura	Increible	Moda	Belleza	Players	Familia	Religión	Local	Y Además			

Los nacidos en la posguerra y durante el invierno tienen más probabilidad de ser esquizofrénicas

23/04/2012 - T.I., MADRID

Según concluyen científicos de la Universidad de Granada.
El riesgo de esta enfermedad mental está relacionado con el déficit de vitamina D.

Me gusta

0

Deja tu comentario

ÚLTIMA HORA

- El cocinero Berasategui afirma que el secreto de su éxito es "humildad, respeto y trabajo"
- Down España y Divina Pastora Seguros impulsarán un proyecto de la 'Lectura Fácil' para personas con síndrome de Down
- Fallece el editor Josep Maria Berenguer, padre de la revista "El Vibora"
- Una campaña en la red social hace circular billetes pidiendo la libertad de Ruth y José

Las personas nacidas durante la posguerra (considerada ésta hasta el año 1959) y durante los meses de invierno (enero, febrero o marzo) tienen más posibilidades de desarrollar esquizofrenia **en el comienzo de la edad adulta**, según un estudio publicado por científicos de la Universidad de Granada.

Los autores de la investigación concluyen que el riesgo de tener esta enfermedad mental está **relacionado con el déficit de vitamina D**, que en parte podría explicar la asociación observada entre nacer en invierno - estación con menos exposición a la luz solar y, por tanto, menor producción de vitamina D- y el mayor riesgo de esquizofrenia, y también la mayor prevalencia de esquizofrenia detectada **en países más al norte, donde hay menos luz solar**.

El estudio, publicado en la revista **'Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry'** y realizado sobre datos de personas que requirieron hospitalización psiquiátrica entre 1998 y 2006, confirma, según sus autores, que entre quienes tienen esquizofrenia hay una elevada proporción de nacidos en invierno, **especialmente en el mes de enero**.

En el estudio ha colaborado el doctor Francisco Díaz Atienza, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, junto a investigadores del Departamento de Psiquiatría y del Instituto de Neurociencias (José María Martínez-Ortega, María Dolores Carretero, Luis Gutiérrez-Rojas, Dolores Jurado y Manuel Gurpegui).

AL MINUTO

- 13:19 Corea del norte amenaza con aniquilar a la horda de ratones de Corea del Sur
- 13:17 Francia quiere que la UE cierre sus fronteras a los inmigrantes
- 13:10 Inician una huelga de hambre en la Cámara vasca en protesta por el juicio contra D3M
- 13:10 Italia coloca 3.443 millones de

SÍGUENOS EN...



LO MÁS VISTO

1 / 5

- 1  Los pensionistas pagarán entre 8 y 18 euros al mes por sus medicinas
- 2 "La Familia Real se ha vuelto a unir porque se juegan el trono"
- 3  Plácido Domingo dirige 'Le Cid' en el Palau de les Arts de Valencia
- 4  El Rey: "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir"
- 5  El PP podrá elegir al presidente de RTVE sin consenso
- 6  Educación sube la matrícula universitaria hasta un 50%

Me gusta

0

Deja tu comentario

OTRAS NOTICIAS

Comienza en el Parlamento asturiano la reunión entre Cascos (Foro) y Fernández (PP)

Inditex, Mercadona y Repsol son las marcas con mejor reputación en España, según Merco 2012

El coste medio de celebrar una comunión en España se sitúa en 2.125 euros

El padre Ángel, declarado Huésped de Honor en Buenos Aires por la labor de Mensajeros de la Paz en Argentina

o COMENTARIOS

DEJA TU COMENTARIO

Comenta *

Nombre de usuario *

Email *