

Miércoles, 02 de Mayo de 2012

SECCIONES

SUPLEMENTOS

SERVICIOS

GUIA DE CINE

FOROS

OPINIÓN

EDICTOS

BUSCAR

[Portada](#) | [Nacional](#) | [Internacional](#) | [Económico](#) | [Local](#) | [Deportes](#) | [Justicia](#) | [Legal](#) | [En Escena](#) | [Joven](#) | [Cultural](#) | [Monitor](#)


Cultural

Mejor nacer en verano

Por: El Porvenir / Especial, Lunes, 30 de Abril de 2012

Las personas nacidas durante la posguerra (considerada hasta el año 1959) y durante los meses de invierno (enero, febrero y marzo) tienen más posibilidades de desarrollar esquizofrenia en el comienzo de la edad adulta.

El riesgo de padecer esta enfermedad mental está relacionado con el déficit de vitamina D, que en parte podría explicar la asociación observada entre nacer en invierno (estación con menos exposición a la luz solar y, por tanto, menor producción de vitamina D) y el mayor riesgo de esquizofrenia; y también la mayor prevalencia de esquizofrenia detectada en países más al norte, donde hay menos luz solar.

Estos son algunos de los resultados de un artículo publicado en la revista *Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry* por científicos de la Universidad de Granada (España) sobre datos de personas que requirieron hospitalización psiquiátrica entre 1998 y 2006.

El estudio confirma que entre quienes padecen esquizofrenia hay una elevada proporción de nacidos en invierno, especialmente en el mes de enero, comparada con la proporción en los otros meses del año.

En el estudio ha colaborado Francisco Díaz Atienza, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, junto a José María Martínez-Ortega, María Dolores Carretero, Luis Gutiérrez-Rojas, Dolores Jurado y Manuel Gurpegui del Instituto de Neurociencias.

El objetivo de esta investigación fue comparar las tasas de nacimiento en invierno entre 321 pacientes con esquizofrenia de Granada hospitalizados entre los años 1998 y 2006.

Además, se analizó si la proporción de pacientes con esquizofrenia nacidos en invierno se distribuía por igual entre hombres y mujeres, y también si esta proporción fue distinta entre los nacidos durante la posguerra de la guerra civil española (un tiempo caracterizado por una mayor restricción alimentaria) y los nacidos después.

El estudio mostró que la diferencia del exceso de nacimientos en invierno entre hombres y mujeres con esquizofrenia fue similar (aunque en mujeres la proporción observada no fue significativamente superior a la esperada debido al pequeño tamaño muestral).



Ver Comentarios (0)



Escribir Comentario



Lo Interesante▼

- [Premios y Reconocimientos](#)
- [Hablando con el Padre Juanjo](#)
- [Ciudad del Conocimiento](#)
- [Nacimientos Múltiples](#)
- [Beatificación de Juan Pablo II](#)

Siguenos En ▼



Otras Noticias

- Gana grupo cubano Sine Nomine el certamen "Jalisco Canta"
- Un hospital muy singular
- Niños contra la adulta indiferencia del mundo
- Clausuran con éxito en el CCEmx Festival Cuenteros y Cuentistas 2012

BuscaNotas▼

Escriba una palabra clave para iniciar la búsqueda de notas



Más opciones de búsqueda +

